

ALSIR® 5 % Solución Inyectable para Bovino (Terberos) Porcino



1 ml contienen:

Principio activo

Enrofloxacin 50 mg

Forma farmacéutica

Solución inyectable.

DATOS CLINICOS

Especies de destino

Bovino (Terberos)

Porcino

Perro

Indicaciones de uso, especificando las especies de destino

Antibiótico con acción antimicroplásmica para el tratamiento de enfermedades infecciosas de terneros, cerdos y perros producidas por las siguientes bacterias gram-positivas, gram-negativas y micoplasmas sensibles a la enrofloxacin:

Bovino: *E. Coli*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Mycoplasma bovis*.

Porcino: *E. Coli*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*.

Perro: *E. Coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.*, estafilococos.

Ternero: Enfermedades bacterianas del tracto respiratorio y digestivo (pasteurelosis, micoplasmosis, colibacilosis, colisepticemia), así como enfermedades bacterianas secundarias, por ej. el complejo Crowding gripal del ternero.

Cerdo: Enfermedades bacterianas del tracto digestivo (diarrea y/o septicemia colibacilar). Tratamiento y profilaxis del síndrome MMA de las cerdas. Pleuropneumonia debida a *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

Enfermedades bacterianas del tracto respiratorio producidas por *Pasteurella multocida*.

Perro: Infecciones individuales y mixtas bacterianas de los órganos respiratorios y digestivos, del aparato urinario, de la piel, así como la prevención de infecciones en heridas.

Contraindicaciones

No deben tratarse animales con trastornos del crecimiento cartilaginosos.

Excluir del tratamiento los perros menores de 12 meses en razas de tamaño pequeño y mediano y 18 meses en razas grandes o que no hayan finalizado su fase de crecimiento. También se excluirán los perros con historial clínico epiléptico y con alteraciones nerviosas relacionadas con el GABA.

Advertencias especiales para cada especie de destino

No se han descrito.

Reacciones adversas (frecuencia y gravedad)

Ocasionalmente pueden presentarse trastornos gastrointestinales en perros y terneros. La administración del producto por vía intramuscular puede producir una reacción inflamatoria de intensidad variable en los puntos de inyección que puede persistir hasta 14 días.

Uso durante la gestación o la lactancia

No se dispone de información sobre su seguridad en cerdas gestantes, por lo que el veterinario debe valorar la relación riesgo/beneficio antes de su uso en cerdas en gestación.

El enrofloxacin no ha manifestado ningún efecto sobre la reproducción o ser potencialmente teratogénico, en estudios de toxicidad sobre la función reproductora de animales de laboratorio.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

Pueden presentarse efectos antagónicos en administración conjunta con cloranfenicol (perros), macrólidos o tetraciclinas.

Pueden aparecer interacciones a nivel hepático con otros fármacos de eliminación hepática. En perros, la administración concomitante de enrofloxacin y teofilina puede producir un incremento en las concentraciones plasmáticas de teofilina.

Posología y vía de administración

Terneros:

1 ml de ALSIR® 5% por 20 kg p.v. al día, equivalente a: 2,5 mg/kg p.v./ día

Efectuar el tratamiento durante 5 días consecutivos.

Administrar por vía subcutánea evitando aplicar más de 10 ml en el mismo punto de inyección.

Cerdos:

1 ml de ALSIR® 5% por 20 kg p.v. al día. equivalente a: 2,5 mg/kg p.v./día

Efectuar el tratamiento durante 3 días consecutivos.

El tratamiento del síndrome MMA de las cerdas se realizará durante 1 ó 2 días consecutivos.

Administrar por vía intramuscular en la musculatura del cuello. No aplicar más de 2,5 ml en el mismo punto de inyección.

Perros:

1 ml de ALSIR® 5% por 10 kg p.v. al día. equivalente a: 5 mg/kg p.v./día

Administrar por vía subcutánea durante 5 días consecutivos. En enfermedades crónicas y de curso grave la duración del tratamiento puede ampliarse hasta 10 días.

En caso de no observar una mejoría clínica en el plazo de 3 días, reconsiderar el tratamiento.

DATOS FARMACEUTICOS

Tiempos de espera

Porcino: Carne: 7 días.

Bovino (terneros): Carne: 7 días.

Precauciones especiales de conservación

Conservar a una temperatura inferior a 30°C.

Presentaciones comerciales

Caja con 1 vial 250 ml.

Caja con 5 viales de 50 ml

Número(s) de la autorización de comercialización
903 ESP