

ALSIR® 10 Comprimidos para Perros y Gatos



Un comprimido contiene 50,0 mg de enrofloxacin.

Forma farmacéutica

Comprimido.

ESPECIES DE DESTINO

Perros y Gatos.

Indicaciones de uso, especificando las especies de destino

Antibiótico con acción antimicrobiana para el tratamiento de enfermedades infecciosas en perros y gatos, producidas por las siguientes bacterias gram positivas y gram negativas sensibles a enrofloxacin: *E.coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.* Y *Staphylococcus spp.*

ALSIR® 10 comprimidos está indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas individuales y mixtas de los órganos respiratorios y digestivos, del aparato urinario, del oído, de la piel así como el tratamiento de infecciones en heridas.

El uso de este producto debe restringirse a aquellos casos en los que las bacterias se muestren resistentes a otros antibióticos; se realizará, previo a su uso, una confirmación bacteriológica del diagnóstico y un test de sensibilidad de la bacteria causante del proceso.

Si no existe mejora en los tres días siguientes de iniciada la terapia puede estar indicado un cambio en la terapia escogida.

Contraindicaciones

No deben tratarse animales con trastornos del crecimiento cartilaginosa.

Excluir del tratamiento los perros menores de 12 meses en razas de tamaño pequeño y mediano, y 18 meses en razas grandes, o que no hayan finalizado su fase de crecimiento. También se excluirán los animales con historial clínico epiléptico y con alteraciones nerviosas relacionadas con el GABA.

No tratar casos de hipersensibilidad demostrada a enrofloxacin.

Advertencias especiales

Efectos retinotóxicos, incluyendo ceguera pueden ocurrir en gatos cuando se exceden las dosis recomendadas.

Reacciones adversas

Ocasionalmente pueden presentarse trastornos gastrointestinales.

Alteraciones del Sistema Nervioso Central.

Reacciones de hipersensibilidad.

Uso durante la gestación o la lactancia

No tratar a hembras en fase de gestación y/o lactación.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

Pueden presentarse efectos antagónicos en administración conjunta con cloranfenicol, macrólidos o tetraciclinas.

Pueden aparecer interacciones a nivel hepático con otros fármacos de eliminación hepática por lo que no se aconseja su uso conjunto en perros y gatos con teofilina.

Por vía oral, la administración simultánea de sustancias que contengan magnesio, calcio y aluminio puede reducir la absorción de enrofloxacino.

En animales sometidos a rehidratación, evitar la excesiva alcalinidad de la orina.

No administrar simultáneamente con antiinflamatorios no esteroideos.

Posología y vía de administración

Para asegurar una correcta dosificación se debe determinar el peso de los animales.

Administrar por vía oral, aplicando el comprimido directamente en la boca o mezclado con el alimento.

Dosificación: 5 mg de enrofloxacino/kg p.c./día o:

1 comprimido de ALSIR® 10 por 10 kg de p.c. al día

Efectuar el tratamiento durante 5 días consecutivos. En enfermedades crónicas y de curso grave la duración del tratamiento puede ampliarse hasta 10 días.

Periodo de validez

Periodo de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 5 años.

Precauciones especiales de conservación

No conservar a temperatura superior a 30°C.

Presentaciones comerciales

Cajas con 8 comprimidos.

Número de la autorización de comercialización

0902 ESP