



Tiras reactivas orales de detección de tioles.



Prueba semicuantitativa de detección de tioles orales asociados a la periodontitis.

Cómo usar OraStripdx

Deslice suavemente la tira por el margen gingival maxilar durante 10 segundos, este es el lugar donde hay mayor concentración de tioles.¹

Asegúrese de que la lengua (que también puede albergar bacterias productoras de tioles) no entre en contacto con la almohadilla porosa de la tira reactiva.

Interpretación de los resultados

Después de 10 segundos, la almohadilla cambiará de color blanquecino a varias intensidades de amarillo, mostrando así la concentración de tioles presentes.

NEGATIVO **POSITIVO**

 + ++ +++

Resultado del test OraStripdx*	Probabilidad de inflamación gingival significativa	Probabilidad de pérdida de hueso alveolar
Negativo	0%	0%
+	>50%	>33%
+++	100%	100%

Abril 2022
*Origen de datos: Queck KE et al. *J Am Anim Assoc* 2018.
1. Marretta SM et al. Pilot evaluation of a novel test strip for the assessment of dissolved thiol levels, as an indicator of canine gingival health and periodontal status. *Can Vet J* 2012;53(12):1260-1265.

Solo para uso en animales.

Almacenamiento: 5-25°C.

Mantener fuera del alcance de los niños. Evite la luz solar directa.

Ecuphar Veterinaria SLU, Edificio Slow, C/ Cerdanya, 10-12, pl 6

08173 Sant Cugat del Vallés - Barcelona – España

info@ecuphar.es

ES número de inscripción: 11481-SCPF

EC 1589-22-01